**Hoflieferprodukte**
Produktdatenblatt

# Calcitop Verde




Packung à 12 Boli

Bio-Calcium- und Phosphorbolus für Milchkühe

- Rasch verfügbares Calcium und Phosphor
- Unterstützt die Widerstandsfähigkeit und Fruchtbarkeit
- Gezielte und einfach Anwendung
- Diätergänzungsfuttermittel für Milchkühe zur Verringerung der Gefahr von Milchfieber
- Gemäss FiBL-Betriebsmittelliste für den biologischen Landbau in der Schweiz zugelassen

## 1 Zusammensetzung

Dicalciumphosphat, Calciumgluconat, Magnesiumoxid

Zusatzstoffe je kg
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:

| | per kg |
|---|---|
| 3a671 Vitamin D3 | 200.000 IU |

Analytische Bestandteile: Calcium 27,0 %, Magnesium 3%, Natrium <0.1%, Phosphor 15%

1 Gabe CALCITOP Verde:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 Calciumboli | 49 g reines Calcium | 27 g reiner Phosphor | 36.000 I.E. Vitamin D3 |

## 2 Anwendung / Wirkung

### 2.1 Einsatzempfehlung

CALCITOP Verde unser BIO BOLUS zur Verringerung der Gefahr von Milchfieber.
Der Einsatz von CALCITOP Verde stellt eine sichere und einzeltierbezogene Lösung zur Verbesserung der Calcium– und Phosphorversorgung dar. Mit zunehmendem Altem und höherer Leistung der Tiere steigt der Calcium– und Phosphorbedarf um die Kalbung an. CALCITOP Verde unterstützt die Versorgung mit Calcium und Phosphor in Phasen mit erhöhtem Bedarf. Die gesamtheitliche Strategie gegen Milchfieber kann mit dem CALCITOP VERDE Bolus abgerundet / ergänzt werden
.
Zwei auf einen Schlag - optimale Versorgung um die Abkalbung:

- Hochdosierter Bolus mit schnelllöslichem Calciumgluconat
- Calciumquelle ist besonders verträglich und schnell verwertbar
- Mit hohem Phosphorgehalt in Phasen mit erhöhtem Bedarf
- Enthält zusätzlich Vitamin D3 für die Unterstützung bei der Calcium-Mobilisation
- Empfohlene Dosis 1 - 2 Boli kurz vor und direkt nach der Kalbung

### 2.2 Anwendungsempfehlung

Durch die Verabreichungsform von zwei Boli in einer Dosis wird dem Tier die gesamte Menge an Inhaltsstoffen ohne Verluste zur Verfügung gestellt.

1-2 Bolus ca.12h vor dem Kalben
1-2 Bolus direkt nach dem Kalben
1-2 Bolus ca. 12h nach dem Kalben
Ev. 1-2 Bolus 24h nach dem Kalben

Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Futtermittelexperten einzuholen.

Dosierung: je 1 – 2 Bolus pro Anwendung




## 3 Sicherheitshinweise

Der Bolus darf nur mit einem passenden Applikator (Eingeber) über das Maul verabreicht werden.
Der Bolus darf nur stehenden Tieren verabreicht werden. Insbesondere festliegenden Tieren darf der Bolus nicht eingegeben werden.
Der Bolus darf nur unbeschädigt verwendet werden.

Die gleichzeitige Supplementierung von Zusatzstoffen mit einem Höchstgehalt aus anderen Quellen als einem Bolus ist zu vermeiden.

### 3.1 Vorgehen:

1. Den Eingeber vor dem Befüllen auf Funktionsfähigkeit und Sauberkeit prüfen
2. Den Bolus vorsichtig und vollständig in den Applikator einführen. Das Tier gut fixieren, dabei seinen Kopf leicht nach oben halten. Dazu rückwärts zum Tier stehen und den Kopf von oben umgreifen (Untergriff) oder ein Halfter verwenden. Auf Abwehrbewegungen gefasst sein. Den Eingeber vorsichtig ohne Kraftaufwand oberhalb der Zunge ins Maul des Tiers einführen, bis er im hinteren Bereich auf einen Widerstand am Zungenrücken stösst (Zungenwulst). Dabei die freie Hand zur Führung verwenden.
3. Den Eingeber über den Widerstand des Zungenwulstes hinüberschieben und erst danach abdrücken.




### 3.2 Empfohlene Hilfsmittel

Verwenden Sie den **Boli Applikator** aus dem Sortiment von Swissgenetics.

## 4 Lagerhinweise

Trocken lagern

Beachten Sie die Haltbarkeit des Produktes.

## 5 Fachartikel




https://die-fruchtbare-kuh.ch/herde/die-herde-kontrollieren/frischgekalbte-kuehe-ueberwachen/
oder als PDF

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren Aussendienst, an hoflieferprodukte@swissgenetics.ch
oder Telefon 071 982 74 73